

# Handlungsbewertungsliste

## „Blasenverweilkatheterisation der Frau“

Name:

Kurs:

Datum:

- Katheterisation nur nach ärztlicher Verordnung
  - Rechtsgrundlage
- Katheterisationen der Blase werden, wenn nötig, grundsätzlich von zwei Pflegenden durchgeführt.
- Situation des Bewohners oder Arbeitsweise ist ausschlaggebend (Pfleger sprechen sich ab über Durchführung und Assistenz)
- Durch die Benutzung von unterschiedlichen Materialien, Systemen und/oder Fabrikaten variiert das Vorgehen im Einzelnen.
- Orientierung an Patienten
- Aseptisches Vorgehen unbedingt beachten und einhalten (Infektionsprophylaxe)
- situative Vorgehensweise

### Handlung

### Bewertung

#### Vorbereitung:

Durchgeführt	teilweise	Nicht durchgeführt
--------------	-----------	--------------------

- |    |  |                       |                       |                       |
|----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Erkundigt sich nach „Hindernissen“, Vorgehen (Alltagsgespräch) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. | <u>Steriles Katheterset mit:</u>                               |                       |                       |                       |
|    | - Tupfer 6 (Pflaumengroß)                                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | - Handschuhe (3Stück)  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | - Schleimhautdesinfektion (jodfrei)                            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | - Schlitztuch  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | - Gleitmittel  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | - 10 ml. Aqua destillata in Spritze                            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | - evtl. 2 anatomische Pinzetten                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | - evtl. Mullkomresse   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | - Arbeitsfläche  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | <u>verpackt: steril</u>  |                       |                       |                       |
|    | - Blasenverweilkatheter (2 Stück)                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | - Urinableitungssystem (situativ)                              |                       |                       |                       |
|    | - oder anderes Set   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | <u>unsteril:</u>   |                       |                       |                       |
|    | - Schutzunterlage  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | - Schutzkittel   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | - Abfallbehälter   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | <u>generell:</u>   |                       |                       |                       |
|    | - Ersatzset mitnehmen  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | <u>Intimpflegeutensilien</u>                                   |                       |                       |                       |

(s. Handlungsbewertungsliste Intimpflege)

- |   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. Bespricht mit der Empfängerin (den Zweck) und das Vorgehen                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. Schützt die Intimsphäre der Empfängerin                                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5. Stimuliert eigene Bewegungsaktivitäten der Empfängerin (aktivierende Pflege) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. Bringt das Bett auf Arbeitshöhe (bequeme Ausgangsposition)                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7. Erteilt Auskunft während der Vorbereitung und Durchführung                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Durchführung:**

- |  |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Läßt evtl. Intimtoilette durchführen(möglichst von Patienten selbst)                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| - Händedesinfektion  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| - öffnet Katheterset (vorher Verwendbarkeit überprüfen)  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| ↔ Blasenverweilkatheter  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| ↔ und Urinalableitungssystem steril auf die sterile Arbeitsfläche ablegen                            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| - Handschuhe anziehen  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| - sterile Arbeitsutensilien strukturiert auf der sterilen Arbeitsfläche ordnen                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| - Katheter mit Beutel verbinden  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| -Schleimhautdesinfektion über die Tupfer gießen  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| - Schlitztuch auflegen   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| -Desinfektion der Schamlippen  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| - Folie von Katheter öffnen  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| - Katheterspitze in Gleitmittel tauchen  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| - Katheter schieben bis Urin kommt   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| - Katheter weiter 2-3 cm einschieben   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| - Blocken danach Katheter auf Blasengrund ziehen   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| - Urinmenge beachten, höchstens 500 ml wegen Gefahr des Blasenkolaps, sonst abklemmen mit Peanklemme | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| - Urinbeobachtung nach allgemeinen Kriterien   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| - Evaluiert - Korrektur, ggfs. die gewährte Unterstützung  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| - Sorgt für die Umgebung des Empfängers  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| - Entsorgt die Materialien entsprechend  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| - Protokolliert das Katheterisieren und klärt über Pflegemaßnahmen auf                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| - Meldet Auffälligkeiten <u>sofort</u> weiter (Arztgespräch)   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Beurteilung:**

- erfüllt

nicht erfüllt

**Bemerkungen:**